



ПЕРЕДОЗИРОВКА НАРКОТИКАМИ:

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ:

Опиоиды:

(героин, опий, метадон, морфин, кодеин, фентанил и др.)

- сильная бледность;
- синюшность губ;
- слабый пульс;
- снижение частоты дыхания;
- сужение зрачков;
- заторможенность;
- отсутствие тонуса мышц;
- общая расслабленность;
- рвота;
- спутанность сознания;
- кома

Психостимуляторы:

(амфетамин, кокаин, метамфетамин, эфедрин и др.)

- паника;
- бред преследования;
- повышенная двигательная активность;
- расширенные зрачки;
- острые головные боли;
- частый пульс или аритмия;
- обильное потоотделение;
- судороги;
- рвота



ЧТО ДЕЛАТЬ???

Звоните в СКОРУЮ ПОМОЩЬ:

- по номеру **103** с сотового телефона;
- по номеру **112** единой экстренной службы;
- по номеру **03** со стационарного телефона



ЧЕМ ПОМОЧЬ?

Пока едет СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Оставайтесь с пострадавшим до прибытия медиков! Первая помощь, оказанная до прибытия врачей, МОЖЕТ СПАСТИ ЖИЗНЬ

Не позволяйте пострадавшему потерять сознание, РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НИМ!!!

Если он не откликается на голос, не двигается, дыхание слабое или отсутствует, делайте следующее:

- **положите** пострадавшего спиной на твердую горизонтальную поверхность
- **поверните** голову на бок
- **разожмите** челюсти
- **очистите** рот от рвотных масс, достаньте язык, если он запал и закрыл горло

НЕЛЬЗЯ!!!

- **бросать** пациента без присмотра
- **помещать** его в ванну
- **позволять** засыпать или терять сознание
- **использовать** психостимуляторы как антидот при передозировке опиоидами, и наоборот